

1 mL

1 Dose

Encephalomyelitis Vaccine

Eastern & Western, Killed Virus

Tetanus Toxoid

Equiloid Innovator[®]

For intramuscular vaccination of healthy horses 10 months of age or older as an aid in the prevention of equine encephalomyelitis due to Eastern and Western viruses, and tetanus.

Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING.
SHAKE WELL. Do not vaccinate within 21 days before slaughter.

Thimerosal, neomycin and polymyxin B added as preservatives.

See reverse side for complete directions.

U.S. Vet. License No. 190

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007, USA

Serial No.:

N° de Lote:

Exp. Date:

Fecha de Venc.:

Equiloid Innovator[®]

zoetis 50148000

↑ PEEL HERE
DESPEGUE AQUI

Equiloïd Innovator®

INDICACIONES: Para la vacunación de caballos sanos de 10 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de la encefalomielitis equina debida a los virus del Este y Oeste, y el tétanos.

DOSES Y ADMINISTRACIÓN: Caballos, inyectar una dosis de 1 mL por vía intramuscular utilizando una técnica aséptica. Administrar una segunda dosis de 1 mL de 3 a 4 semanas después de la primera dosis. Se recomienda administrar una dosis de refuerzo de 1 mL anualmente. Se puede recomendar la revacunación temprana cuando los caballos se encuentren frente a un brote o en otras condiciones en las cuáles haya una probable exposición al virus.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. AGITAR BIEN. Utilizar todo el contenido una vez abierto. En algunas ocasiones, pueden presentarse reacciones locales transitorias en el sitio de inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina.

Contiene tимерosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes.

Uso Veterinario

Desprender la etiqueta con el número de lote y la fecha de vencimiento y colocarlo en el registro médico del animal.

Equiloïd Innovator®

INDICATIONS: For vaccination of healthy horses 10 months or age or older as an aid in the prevention of equine encephalomyelitis due to Eastern and Western viruses, and tetanus.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Horses, inject one 1 mL dose intramuscularly using aseptic technique. Administer a second 1 mL dose 3 to 4 weeks after the first dose. A 1 mL booster dose should be given annually. Early revaccination may be advisable when horses are faced with an outbreak or with other conditions which might make heavy exposure likely.

CAUTION: Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. SHAKE WELL. Use entire contents when first opened. In some instances, transient local reactions may occur at the injection site. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Thimerosal, neomycin and polymyxin B added as preservatives.

For Veterinary Use Only

Remove serial number and expiration date label and place on the animal's medical chart.

50148000

TOP