

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500 mL/500 ml

1,000 Doses/1,000 dosis

# Mycoplasma Gallisepticum Bacterin Bacterina de Mycoplasma Gallisepticum

Para la vacunación subcutánea o intramuscular de aves y pavos como una ayuda en la prevención de los signos clínicos asociados con la infección de *Mycoplasma gallisepticum*.

For the subcutaneous or intramuscular vaccination of chickens and turkeys as an aid in the prevention of clinical signs associated with *Mycoplasma gallisepticum* infection.

**DOSE:** Inject 0.5 mL (0.5 cc) subcutaneously (in the lower neck region) for birds 1 to 10 weeks of age using aseptic technique. For birds 10 weeks of age or older, may

**DOSIS:** Inyectar 0,5 ml (0,5 cc) subcutáneamente (en la parte inferior del cuello) en aves de 1 a 10 semanas de edad usando técnicas asépticas. Para aves de 10 semanas o mas, se puede vacunar intramuscularmente o subcutáneamente. Vacunar solamente aves sanas antes del desafio de campo. Luego, adicionar el resto del programa de vacunación que debería completarse antes de la postura.

**PRECAUCIÓN:** Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (36° a 45°F). No congelar. Entibiar a 22°C (72°F) y agitar bien antes de su uso. No vacunar en los 42 días previos al sacrificio. No vacunar a parrilleros o pavos de consumo por vía intramuscular. Una reducción en la producción de huevos puede ocurrir si se vacunan las aves durante la postura. Usar todo el contenido en cuanto se abra.

Contiene penicilina como conservante.

**ADVERTENCIA:** Si se inyecta accidentalmente en una persona, debe consultarse a un médico inmediatamente, informando que se trata de una vacuna de emulsión oleosa.

## MG-Bac®

For Veterinary Use Only  
Para uso veterinario únicamente

U.S. Vet. License No. 190  
Licencia Vet. de EE.UU. N° 190

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

vaccinate intramuscularly or subcutaneously. Vaccinate only healthy birds prior to field exposure. The vaccination program should be completed prior to the point of lay. For optimum results, vaccinate twice, allowing at least 4 weeks between vaccinations. Revaccinate birds during molt before the second laying period.

**CAUTION:** Store in the dark at 36° to 45°F (2° to 7°C). Do not freeze. Warm to 72°F (22°C) and shake well before using. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Do not vaccinate broilers or meat turkeys by the intramuscular route of administration. If birds are vaccinated during lay, a drop in egg production may occur. Use entire contents when first opened.

Penicillin added as a preservative.

**WARNING:** In case of accidental human injection seek immediate medical attention, stating the vaccine is an oil emulsion type.

List No. 2173

Serial No.  
Exp. Date

1 39 58 600



FPO: 128  
1510221000



7 26287 90221 8

FPO: UPC