

10 x 20,000 Doses

10 x 20.000 Dosis

# Escherichia Coli Vaccine

Live Culture

## Vacuna contra Escherichia Coli

Cultivo Vivo

This vaccine is recommended for mass administration to healthy chickens or turkeys as an aid in the prevention of disease caused by *Escherichia coli*.

Store in the dark at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Inactivate unused contents before disposal. See reverse side for complete directions.

Federal regulations prohibit the repackaging or sale of the contents of this carton in fractional units. Do not accept if seal is broken.

THIS PRODUCT IS NONRETURNABLE.

### Poulvac® E. coli

FOR VETERINARY USE ONLY  
USO VETERINARIO

VLN 190/PCN 1551.R0  
Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

zoetis

Esta vacuna se recomienda para la administración masiva en pollos o pavos sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por *Escherichia coli*.

Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Utilizar todo el contenido una vez abierto. Inactivar sobrantes o el contenido sin utilizar antes de desechar el envase. Ver las instrucciones completas al reverso.

Los reglamentos federales de EE.UU. prohíben el reembalaje o la venta del contenido de esta caja en unidades fraccionadas. No aceptarla si está roto el sello.

ESTE PRODUCTO NO ES RETORNABLE.

50192700



IMPRINT AREA  
NO COPY  
NO VARNISH

Serial No.:  
Nº de lote:

Exp. Date:  
Fecha de  
venc.:

# Poulvac® E. coli

## DIRECTIONS

This vaccine is recommended for mass administration to healthy chickens or turkeys as an aid in the prevention of disease caused by *Escherichia coli*.

### Vaccine Preparation

1. Remove seal and stopper. Half-fill vial with cool, distilled water. Replace stopper and shake until dissolved.
2. Pour rehydrated vaccine into a clean container and add cool, distilled water to dilute the vaccine as appropriate for your specific coarse spray vaccination equipment or watering system.
3. Administer at a rate of one dose of prepared vaccine per bird.

**Chickens:** Vaccinate by coarse spray or drinking water at 1 day of age or older. A second vaccination is recommended for long-lived birds at 12-14 weeks of age.

**Turkeys:** Vaccinate by coarse spray at 3 days of age with a second dose at 3 weeks of age.

## PRECAUTIONS

If possible, vaccinate all susceptible birds on the premises at the same time. For 10 to 14 days after vaccinating, avoid carrying vaccine particles on shoes, clothing, etc., into areas where there are non-vaccinated birds. Do not mix with other products, except as specified on this label.

Concurrent use of antibiotics with this vaccine is not recommended.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471 (USA), (800) 461-0917 (Canada).

## INSTRUCCIONES

Esta vacuna se recomienda para la administración masiva en pollos o pavos sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por *Escherichia coli*.

### Preparación de la vacuna

1. Retirar el sello y el tapón. Llenar el frasco hasta la mitad con agua destilada fresca. Volver a colocar el tapón y agitar hasta que la vacuna esté disuelta.
2. Verter la vacuna rehidratada en un recipiente limpio y agregar agua destilada fresca para diluir la vacuna como corresponda según las instrucciones de la máquina aspersora para la vacunación con gota gruesa o del sistema de bebederos para la administración de la vacuna en el agua de bebida.
3. Administrar a razón de una dosis de vacuna preparada por ave.

**Pollos:** Administrar la vacuna por aspersión con gota gruesa o en el agua de bebida en aves de 1 día de edad o mayores. Se recomienda una segunda vacunación en aves con una vida más prolongada a las 12 – 14 semanas de edad.

**Pavos:** Administrar la vacuna por aspersión con gota gruesa a los 3 días de edad y posteriormente revacunar a las 3 semanas de edad.

## PRECAUCIONES

De ser posible, vacunar todas las aves susceptibles de la granja al mismo tiempo. Durante 10 a 14 días después de la vacunación, evitar el acarreo de partículas vacunales en los zapatos, ropa etc., hacia áreas en donde se encuentren aves no vacunadas. No mezclar con otros productos a excepción de lo especificado anteriormente en la etiqueta.

No es recomendable el uso simultáneo de antibióticos con esta vacuna.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471 (EE.UU.), (800) 461-0917 (Canadá).