

500 mL

1,000 Doses/1.000 Dosis

Bursal Disease-Reovirus Vaccine

Standard and Variant, Killed Virus

Vacuna contra la Enfermedad de la Bolsa de Fabricio-Reovirus

Estándar y Variante, Virus Inactivado

Para la revacunación de aves progenitoras y reproductoras sanas, como ayuda en la prevención de los signos y lesiones asociados con la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio (bursitis) causada por cepas estándares y variantes e infecciones por reovirus aviares que causan el síndrome de mala absorción. Ayuda a la progenie de las aves vacunadas en la prevención de los signos y lesiones asociados con la enfermedad infecciosa de la bolsa de Fabricio (bursitis), y la enfermedad causada por reovirus, vía anticuerpos maternos.

For the revaccination of healthy chickens as an aid in the prevention of the signs and lesions associated with infectious bursal disease caused by standard and variant strains and avian reovirus infections which cause malabsorption syndrome. Progeny of vaccinates are aided in the prevention of signs and lesions associated with infectious bursal disease and reovirus disease via maternal antibodies.

DOSIS: Inyectar 0,5 ml (0,5 cc) por vía intramuscular o subcutánea (en la parte inferior del cuello), utilizando una técnica aséptica. Vacunar solamente aves sanas. Para las aves inmunológicamente activadas por exposición previa al antígeno, está indicada una sola dosis entre las 16 y 22 semanas (aproximadamente 4 semanas antes del comienzo de la postura).

DOSE: Inject 0.5 mL (0.5 cc) intramuscularly or subcutaneously (in the lower neck region) using aseptic technique. Vaccinate only healthy birds. For primed birds, a single dose between 16 and 22 weeks (approximately 4 weeks prior to lay) is indicated.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). No congelar. Permita que la vacuna alcance los 22°C (72°F) y agite bien antes de su uso. No vacunar dentro de los 42 días anteriores al sacrificio. Utilizar todo el contenido una vez abierto.

CAUTION: Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). Do not freeze. Warm to 22°C (72°F) and shake well before using. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened.

Contiene gentamicina y anfotericina B como agentes conservantes.

Gentamicin and amphotericin B added as preservatives.

ADVERTENCIA: En caso de inyección accidental en humanos, buscar atención médica inmediatamente.

WARNING: In case of accidental human injection seek immediate medical attention.

Poulvac Maternavac™ IBD-Reo

For Veterinary Use Only
Uso Veterinario

U.S. Vet. License No. 190
Licencia Vet. de EE.UU. No. 190

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

zoetis