

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores contra *Salmonella enteritidis*, la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa serotipo Massachussets. La duración de la inmunidad no ha sido establecida. Para mayor información referente a los datos de eficacia y seguridad, visite [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

La vacuna ha demostrado ser efectiva contra la colonización de los órganos internos, incluyendo al tracto reproductivo e intestinos, causada por *S. enteritidis* y contra los signos y lesiones causados por la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa.

300 mL

1,000 Doses/1000 Dosis

## Newcastle-Bronchitis Vaccine

Mass. Type, Killed Virus

## Salmonella Enteritidis Bacterin

## Vacuna de Newcastle-Bronquitis

Virus tipo Massachusetts, Virus Inactivo

## Bacterina de Salmonella Enteritidis

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against *Salmonella enteritidis*, Newcastle disease and infectious bronchitis, Mass type. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

The vaccine has been shown to be effective against colonization of the internal organs, including reproductive tract and intestines, caused by *S. enteritidis* and against signs and lesions caused by Newcastle disease and infectious bronchitis.

**DOSIS:** Inyectar 0,3 mL (0,3 cc) por vía subcutánea asepticamente. Vacunar solamente a las aves sanas. Administrar dos dosis, separadas por 3 a 4 semanas.

**PRECAUCIÓN:** Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar. Permita que la vacuna alcance los 22° y 32°C (72° y 90°F) y agítese bien antes de usar. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Contiene gentamicina y formaldehído como conservantes.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

## Poulvac® SE-ND-IB

For Veterinary Use Only  
Uso veterinario

VLN 190/PCN 48D6.10

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007, USA

**zoetis**

**DOSE:** Inject 0.3 mL (0.3 cc) subcutaneously using aseptic technique. Vaccinate only healthy birds. Administer two separate doses 3 to 4 weeks apart.

**CAUTION:** Store in the dark at 2°-8°C (35°-46°F). Do not freeze. Warm to 22°-32°C (72°-90°F) and shake well before using. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Contains gentamicin and formaldehyde as preservatives.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.



Serial No./N° de lote: Exp. Date/Fecha de venc.:

Imprint Area  
No Copy  
No Varnish, No ink

40028460