

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores, contra *Salmonella enteritidis*. La duración de la inmunidad no ha sido establecida. Para más información referente a los datos de eficacia y seguridad, visite productdata.aphis.usda.gov.

La vacuna ha demostrado ser efectiva contra la colonización de los órganos internos, incluyendo al tracto reproductivo e intestinos, causada por *S. enteritidis*.

DOSIS: Inyectar 0,3 mL (0,3 cc) por vía subcutánea asépticamente. Vacunar solamente a las aves sanas. Administrar dos dosis, separadas por 3 a 4 semanas.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar. Permita que la vacuna alcance los 22° y 32°C (72° y 90°F) y agítese bien antes de su uso. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Contiene formalina como agente conservante.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

300 mL

1,000 Doses/1000 Dosis

Salmonella Enteritidis Bacterin Bacterina de Salmonella Enteritidis

Poulvac® SE

For Veterinary Use Only
Uso veterinario

VLN 190/PCN 2785.00

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against *Salmonella enteritidis*. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

This product has been shown to be effective against colonization of the internal organs, including the reproductive tract and intestines caused by *S. enteritidis*.

DOSE: Inject 0.3 mL (0.3 cc) subcutaneously using aseptic technique. Vaccinate only healthy birds. Administer two separate doses 3 to 4 weeks apart.

CAUTION: Store in the dark at 2°-8°C (35°-46°F). Do not freeze. Warm to 22°-32°C (72°-90°F) and shake well before using. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Contains formalin as a preservative.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.



Serial No./N° de lote: Exp. Date/Fecha de venc.:

Imprint Area
No Copy
No Varnish, No ink

40028461