

1000

1000

1000

1000

1000

1000

300 mL

1,000 Doses/1,000 Dosis

## Newcastle-Bronchitis Vaccine

Mass. Type, Killed Virus

## Vacuna de Newcastle- Bronquitis

Virus Tipo Massachusetts, Virus Inactivo

Este producto ha demostrado ser efectivo para la vacunación de pollos sanos de 12 semanas de edad o mayores, contra la enfermedad de Newcastle y de la bronquitis infecciosa serotipo Massachusetts. La duración de la inmunidad no ha sido establecida. Para mayor información referente a los datos de eficacia y seguridad, visite [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**DOSIS:** Inyectar 0.3 mL (0,3 cc) por vía subcutánea utilizando una técnica aséptica. Vacunar solamente a las aves sanas. Administrar dos dosis, separadas por 3 a 4 semanas.

**PRECAUCIÓN:** Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar. Permita que la vacuna alcance los 22° y 32°C (72° y 90°F) y agítese bien antes de su uso. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días antes del sacrificio. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Contiene gentamicina como agente conservante.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

### Poulvac® i N + B

For Veterinary Use Only  
Uso Veterinario

VLN 190/PCN 1776.10

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy chickens 12 weeks of age or older against Newcastle disease and infectious bronchitis Mass. Type. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

**DOSE:** Inject 0.3 mL (0.3 cc) subcutaneously using aseptic technique. Vaccinate only healthy birds. Administer two separate doses 3 to 4 weeks apart.

**CAUTION:** Store in the dark at 2°-8°C (35°-46°F). Do not freeze. Warm to 22°-32°C (72°-90°F) and shake well before using. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Contains gentamicin as a preservative.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

FPO UPC



7 26287 95982 3

Serial No.: Exp. Date:

Imprint Area  
No Copy  
No Varnish, No ink

40028471