

**Caution:** Store between 2° and 7°C (36° and 45°F). Avoid freezing. Shake well before using. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Allergic reactions, although rare, may occur. The antidote is epinephrine. Do not mix with other vaccines or products. Contains penicillin and thimerosal as preservatives.

**Dosage and Administration:** Aseptically inject 2 mL (2 cc) intramuscularly per animal. **Baby pigs:** Inject 2 mL at 7 to 10 days of age or older. Repeat with second dose 2 to 3 weeks after first vaccination. **Feeder pigs:** Inject 2 mL at time of arrival and repeat vaccination 2 to 3 weeks later. **Breeding stock:** Vaccinate susceptible animals or breeding stock of unknown status with two doses given 2 to 3 weeks apart, prior to introduction into a herd.

250 mL



125 Doses/Dosis

## Haemophilus Parasuis-Mycoplasma Hyopneumoniae Bacterin Bacterina contra Haemophilus Parasuis- Mycoplasma Hyopneumoniae

### Suvaxyn® RespiFend® MH/HPS

For Use in Swine  
For Veterinary Use Only

For the vaccination of healthy swine as an aid in the prevention of death due to *Haemophilus parasuis* serovars 4 and 5 and as an aid in the reduction of clinical signs and lesions caused by *Haemophilus parasuis* 5, and as an aid in the prevention of respiratory disease associated with *Mycoplasma hyopneumoniae*. This product contains adjuvanted, inactivated cultures of strains representing *H. parasuis* serovars 4 and 5 and of *M. hyopneumoniae*.

U.S. Vet. License No. 190

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

Para Uso en Cerdos  
Uso Veterinario

Para la vacunación de cerdos sanos como ayuda en la prevención de muertes debidas a las serovariedades 4 y 5 de *Haemophilus parasuis* y como ayuda para reducir los signos clínicos y lesiones causados por *Haemophilus parasuis* 5 y como ayuda en la prevención de la enfermedad respiratoria asociada con *Mycoplasma hyopneumoniae*. Este producto contiene cultivos inactivados y con adyuvante de cepas que representan a las variedades serológicas 4 y 5 de *H. parasuis* y de *M. hyopneumoniae*.

Licencia Vet. de EE.UU. N° 190

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

**Dosis y Administración:** Inyectar asepticamente 2 mL (2 cc) por animal, por vía intramuscular. **Lechones:** Inyectar 2 mL a los 7 a 10 días de edad o mayores. Repetir con una segunda dosis de 2 a 3 semanas después de la primera. **Cerdos de engorde:** Inyectar 2 mL a su llegada y repetir la vacunación de 2 a 3 semanas después. **Cerdos destinados a reproducción:** Vacunar a los animales susceptibles o reproductores de estatus sanitario desconocido con dos dosis administradas con un intervalo de 2 a 3 semanas entre ambas, antes de su introducción a la pira.

**Precaución:** Almacenar entre 2° y 7°C (36° y 45°F). Evitar la congelación. Agitar bien antes de usarse. Utilizar todo el contenido una vez abierto. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Raramente pueden manifestarse reacciones alérgicas. El antidoto es la epinefrina. No mezclar con otras vacunas o productos. Contiene penicilina y tимерosal como agentes conservantes.

Serial No.:  
No. de Lote:

Exp. Date:  
Fecha de  
Vencimiento:



14154500

7 2628791518 8