



Para la vacunación de caballos sanos de 10 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de la viremia causada por el virus del Oeste del Nilo y como ayuda en la prevención de la encefalomielitis equina debida a los virus del Este y Oeste y del tétanos.
Almacener en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACION, AGITAR BIEN. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio.
Contiene timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes.
Ver las instrucciones completas al reverso.
Licencia Vet. de EE.UU. No. 190
Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

West Nile-Innovator® + EWT

Toxide Tetánico

Virus del Este y Oeste Inactivados

Vacuna contra Encefalomielitis-Virus del Oeste del Nilo

1 Dosis

1 mL

1 mL

Encephalomyelitis-West Nile Virus Vaccine

1 Dose

Eastern & Western, Killed Virus

Tetanus Toxoid

West Nile-Innovator® + EWT

For vaccination of healthy horses 10 months of age or older as an aid in the prevention of viremia caused by West Nile virus, and as an aid in the prevention of equine encephalomyelitis due to Eastern and Western viruses, and tetanus.

Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING.
SHAKE WELL. Do not vaccinate within 21 days before slaughter.

Thimerosal, neomycin and polymyxin B added as preservatives.

See reverse side for complete directions.

U.S. Vet. License No. 190

Zoetis Inc.

Kalamazoo, MI 49007, USA

Serial No.:

N° de Lote:

Expiration Date:

Fecha de Venc.:

West Nile-Innovator® + EWT

zoetis

13931000

PEEL HERE
DESPEGUE AQUÍ

West Nile-Innovator[®] + EWT

INDICACIONES: Para la vacunación de caballos sanos de 10 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de la viremia causada por el virus del Oeste del Nilo y como ayuda en la prevención de la encefalomielitis equina debida a los virus del Este y Oeste y del tétanos. La eficacia de la fracción vacunal del Virus del Oeste del Nilo fue demostrada en caballos que recibieron dos dosis de la vacuna y que fueron desafiados con el Virus del Oeste del Nilo un año después de la vacunación. La vacuna protegió al 95% de los vacunados contra la infección, mientras que el 82% de los controles mostraron viremia.

DOIS: Caballos, inyectar una dosis de 1 mL por vía intramuscular utilizando una técnica aséptica. Administrar una segunda dosis de 1 mL de 3 a 4 semanas después de la primera dosis. Se recomienda administrar una dosis de refuerzo de 1 mL anualmente. Se puede recomendar la revacunación temprana cuando los caballos se encuentren frente a un brote o en otras condiciones en las cuales haya una probable exposición al virus.

PRECAUCIÓN: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. AGITAR BIEN. Utilizar todo el contenido una vez abierto. En algunas ocasiones, pueden presentarse reacciones locales transitorias en el sitio de inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. En caso de reacción anafiláctica, administrar epinefrina.

Contiene timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes.

Uso Veterinario

Desprender la etiqueta con el número de lote y la fecha de vencimiento y colocarlo en el registro médico del animal.

West Nile-Innovator[®] + EWT

INDICATIONS: For vaccination of healthy horses 10 months of age or older as an aid in the prevention of viremia caused by West Nile virus, and as an aid in the prevention of equine encephalomyelitis due to Eastern and Western viruses, and tetanus. Efficacy of the West Nile fraction was demonstrated in horses that received two doses of the vaccine and were challenged one year post-vaccination with West Nile virus. The vaccine protected 95% of the vaccinates against infection, while 82% of the controls were viremic.

DOSE: Horses, inject one 1 mL dose intramuscularly using aseptic technique. Administer a second 1 mL dose 3 to 4 weeks after the first dose. A 1 mL booster dose should be given annually. Early revaccination may be advisable when horses are faced with an outbreak or with other conditions which might make heavy exposure likely.

CAUTION: Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. SHAKE WELL. Use entire contents when first opened. In some instances, transient local reactions may occur at the injection site. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine.

Thimerosal, neomycin and polymyxin B added as preservatives.

For Veterinary Use Only

Remove serial number and expiration date label and place on the animal's medical chart.