

zoetis
Pinnacle I.N.

10 DOSES

10 x 2.5 mL Vials of Vaccine
plus 10 x 2.5 mL Vials of Diluent

Streptococcus Equi Vaccine

Live Culture

FOR INTRANASAL USE ONLY. DO NOT ADMINISTER BY ANY ROUTE OTHER THAN INTRANASAL.

For the vaccination of healthy horses 9 months of age or older as an aid in the prevention of disease caused by *Streptococcus equi*.

DOSE: Aseptically rehydrate with the entire contents of the accompanying sterile diluent. Instill the entire rehydrated vaccine into one nostril using a syringe with applicator tip. Administer a second dose 2 to 3 weeks later. Annual revaccination is recommended.

See reverse side for complete directions.

Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. Burn container.

CAUTION: In the absence of a veterinarian-client-patient relationship, Federal law prohibits the relabeling, repackaging, resale, or redistribution of the individual contents of this package. (9 CFR Part 112.6)

Pinnacle® I.N.

U.S. Vet. License No. 190
Licencia Vet. de EE.UU. No. 190

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

zoetis

10 DOSIS

10 frascos de 2,5 mL de vacuna
más 10 frascos de 2,5 mL de diluyente

Vacuna contra Streptococcus equi

Cultivo vivo

PARA USO INTRANASAL SOLAMENTE. NO ADMINISTRAR POR CUALQUIER OTRA RUTA QUE POR VÍA INTRANASAL.

Para la vacunación de caballos sanos de 9 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por *Streptococcus equi*.

DOSIS: Rehidratar asepticamente con todo el contenido del frasco de diluyente estéril que acompaña el producto. Instilar toda la vacuna rehidratada en un fosa nasal usando una jeringa con aplicador intranasal. Administrar una segunda dosis 2 a 3 semanas después. Se recomienda la revacunación anual.

Ver las instrucciones completas al reverso.

Almacenar en la obscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. Incinerar el recipiente.

ADVERTENCIA: En ausencia de una relación veterinario-cliente-paciente, la ley federal de EE.UU. prohíbe el reetiquetado, reembalaje, reventa o redistribución del contenido de esta caja en forma individual. (9 CFR Parte 112.6)

zoetis
Pinnacle I.N.



13929201

Serial No.:
N° de lote:
Exp. Date:
Fecha de
vencimiento:

FOR INTRANASAL USE ONLY. DO NOT ADMINISTER BY ANY ROUTE OTHER THAN INTRANASAL.

For the vaccination of healthy horses 9 months of age or older as an aid in the prevention of disease caused by *Streptococcus equi*.

DOSE: Aseptically rehydrate with the entire contents of the accompanying sterile diluent. Instill the entire rehydrated vaccine into one nostril using a syringe with applicator tip. Administer a second dose 2 to 3 weeks later. Annual revaccination is recommended.

CAUTION: This product contains live bacteria and is designed for intranasal use only. Disinfect hands and equipment after use. Contamination of the user's hands or equipment with reconstituted vaccine could lead to infections if proper disinfection practices are not followed prior to procedures that require asepsis. Injection equipment used to reconstitute or administer Pinnacle I.N. should not be reused, and should be disposed of appropriately. In case of anaphylactoid reaction, administer epinephrine. After administration a small number of horses may experience non-contagious transitory upper respiratory signs including nasal discharge and lymphadenectasis. Purpura hemorrhagica may be seen in hypersensitive individuals following exposure to streptococcal proteins. Store in the dark at 2° to 7°C (35° to 45°F). AVOID FREEZING. Shake well after rehydration. Do not vaccinate within 30 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Burn container and all unused contents.

For Veterinary Use Only

PARA USO INTRANASAL SOLAMENTE. NO ADMINISTRAR POR CUALQUIER OTRA RUTA QUE POR VÍA INTRANASAL.

Para la vacunación de caballos sanos de 9 meses de edad o mayores como ayuda en la prevención de las enfermedades causadas por *Streptococcus equi*.

DOSIS: Rehidratar asepticamente con todo el contenido del frasco de diluyente estéril que acompaña el producto. Instilar toda la vacuna rehidratada en un fosa nasal usando una jeringa con aplicador intranasal. Administrar una segunda dosis 2 a 3 semanas después. Se recomienda la revacunación anual.

PRECAUCIÓN: Este producto contiene bacterias vivas y está diseñado exclusivamente para uso intranasal. Desinfectar las manos e instrumentos después del uso. La contaminación de las manos del usuario o de los instrumentos con la vacuna reconstituida puede causar infecciones si no se siguen apropiadas prácticas de desinfección antes de realizar procedimientos que requieran asepsis. Los instrumentos de inyección que se usen para reconstituir o administrar Pinnacle I.N. no deben usarse otra vez y deberán desecharse apropiadamente. En caso de una reacción anafilactoide, administrar epinefrina. Después de la administración, un número pequeño de caballos puede experimentar síntomas transitorios no contagiosos de las vías respiratorias superiores, incluso secreciones nasales y linfadenectasia. Puede manifestarse Purpura hemorrhagica en individuos hipersensibles después de la exposición a proteínas estreptocócicas. Almacenar en la oscuridad entre 2° y 7°C (35° y 45°F). EVITAR LA CONGELACIÓN. Agitar bien después de la rehidratación. No vacunar dentro de los 30 días antes del sacrificio. Utilizar todo el contenido de este frasco una vez abierto. Incinerar el recipiente y todo el contenido no utilizado.

Uso veterinario