

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

500 mL

1,000 Doses (Dosis)

Avibacterium Paragallinarum Bacterin Bacterina de Avibacterium Paragallinarum

POULVAC® Coryza ABC contiene cultivos inactivados y con adyuvante adicionado, de cepas que representan a las serotipos A, B y C de *Avibacterium paragallinarum*.

Para la vacunación de pollos sanos, como ayuda en la prevención de los signos clínicos asociados a *Avibacterium paragallinarum*, causados por las serotipos A, B y C.

POULVAC® Coryza ABC contains adjuvanted, inactivated cultures of strains representing *Avibacterium paragallinarum* serovars A, B, and C.

For the vaccination of healthy chickens as an aid in the prevention of clinical signs associated with *Avibacterium paragallinarum* caused by serovars A, B, and C.

DOSES: Inyectar 0,5 mL (0,5 cc) por vía subcutánea (en la región inferior del cuello) o por vía intramuscular aséptica-mente. Vacunar solamente a pollos sanos de 8 semanas de edad o más. Revacunar cuando menos 3 semanas después de la vacunación inicial y no menos de 4 semanas antes del inicio de la postura.

PRECAUCION: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° y 46°F). No congelar. Entibiar a 22°C (72°F) y agitar bien antes de su uso. No vacunar dentro de los 42 días antes del sacrificio. Utilizar todo el contenido una vez abierto. Contiene timerosal como conservador. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

POULVAC® Coryza ABC IC₃

For Veterinary Use Only
Uso veterinario

VLN 190/PCN 2658.11

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

zoetis

DOSE: Inject 0.5 mL (0.5 cc) subcutaneously (in the lower neck region) or intramuscularly using aseptic technique. Vaccinate only healthy chickens 8 weeks of age or older. Revaccinate at least 3 weeks following initial vaccination and no less than 4 weeks prior to onset of lay.

CAUTION: Store in the dark at 2° to 8°C (35° to 46°F). Do not freeze. Warm to 22°C (72°F) and shake well before using. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Use entire contents when first opened. Contains thimerosal as preservative. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Technical Services, (888) 963-8471.

