

Poulvac Maternavac® 4

500 mL/500 ml

1,000 Doses/1,000 dosis

Bursal Disease-Newcastle Disease-Bronchitis-Reovirus Vaccine Standard & Variant, Massachusetts Type, Killed Virus

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy primed chickens between 16 and 22 weeks of age against standard and variant infectious bursal disease, Newcastle disease, infectious bronchitis Mass type, and malabsorption due to reovirus. Duration of immunity has not been established. For more information regarding efficacy and safety data, go to productdata.aphis.usda.gov.

The vaccine has been shown to be effective in progeny of vaccinates against standard and variant infectious bursal disease, Newcastle disease, and malabsorption due to reovirus.

Directions: Inject 0.5 mL intramuscularly or subcutaneously using aseptic technique. Vaccinate only healthy birds. For primed birds, a single dose between 16 and 22 weeks (approximately 4 weeks prior to lay) is indicated.

Precautions: Store in the dark at 2°-8°C (35°-46°F). Do not freeze. Warm to 22°-32°C (72°-90°F) and shake well before using. Use entire contents when first opened. Do not vaccinate within 42 days before slaughter. Contains gentamicin and amphotericin B as preservatives. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

Vacuna de la Enfermedad de la Bolsa-Enfermedad de Newcastle-Bronquitis-Reovirus

Estándar & Variante, Virus de Tipo Massachusetts, Virus Inactivado

Este producto ha demostrado ser efectivo en la vacunación de pollos sanos de entre 16 y 22 semanas de edad previamente vacunados contra la enfermedad infecciosa de la bolsa causada por cepas virales estándares y variantes, contra la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa tipo Massachusetts y el reovirus aviar. La duración de la inmunidad no ha sido establecida. Para mayor información sobre los datos de eficacia y seguridad, consulte productdata.aphis.usda.gov.

La vacuna ha demostrado ser efectiva en la progenie de los animales vacunados contra la enfermedad infecciosa de la bolsa, estándar y variante; la enfermedad de Newcastle y la mala absorción debido al reovirus.

Instrucciones: Inyectar 0,5 ml por vía intramuscular o subcutánea, con técnica aséptica. Vacunar solamente a las aves sanas. Para las aves sensibilizadas, está indicada una sola dosis entre las 16 y 22 semanas (aproximadamente 4 semanas antes de la postura).

Precaución: Almacenar en la oscuridad entre 2° y 8°C (35° a 46°F). No congelar. Entibiar a 22°-32°C (72°-90°F) y agitar bien antes de su uso. Usar todo el contenido en cuanto se abra. No vacunar en los 42 días previos a la matanza. Contiene gentamicina y anfotericina B como conservantes. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

For veterinary use only
Uso Veterinario

VLN 190/PCN 12M5.E0

Zoetis Inc.
Kalamazoo, MI 49007, USA

