

zoetis

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

VLN 190/PCN 1995.20  
Ver las instrucciones completas al reverso.  
Polimixina B como agentes conservantes.

gestación.

No ha sido establecida en potros de 3 meses de edad. Este producto también es seguro para usar como una sola dosis durante el tercer trimestre de gestación.  
Almacenar entre 2° y 8°C. Evitar la congelación. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Contiene formalina, timerosal, neomicina y

información sobre la eficacia y datos de seguridad en [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).  
Estudios de seguridad en campo han demostrado que este producto es seguro para ser usado en caballos de 3 meses de edad o mayores. La eficacia del Nilo. Se ha demostrado que la inmunidad dura al menos 12 meses. Se ha demostrado que la inmunidad dura al menos 12 meses. Obtenga más

Este producto ha mostrado ser efectivo para vacunar caballos sanos de 10 meses de edad o mayores contra la viremia causada por el virus del Oeste

## WEST NILE - INNOVATOR®

Virus Inactivado

# Vacuna contra el Virus del Oeste del Nilo

1 Dosis

1 mL

1 mL

1 Dose

## West Nile Virus Vaccine

Killed Virus

## WEST NILE - INNOVATOR®

This product has been shown to be effective for the vaccination of healthy horses 10 months of age or older against viremia caused by West Nile virus. A duration of immunity of at least 12 months has been demonstrated. For more information regarding efficacy and safety data, go to [productdata.aphis.usda.gov](http://productdata.aphis.usda.gov).

Field safety testing has demonstrated that this product is safe for use in horses 3 months of age or older. Efficacy has not been established in foals 3 months of age. This product is also safe for use as a single dose during the third trimester of pregnancy.

Store at 2°-8°C. Do not freeze. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Contains formalin, thimerosal, neomycin, and polymyxin B as preservatives.

See reverse side for complete directions.  
VLN 190/PCN 1995.20

Zoetis Inc.  
Kalamazoo, MI 49007, USA

Serial No.:  
Nº de Lote:

Expiration Date:  
Fecha de Venc.:

zoetis

40038421

WEST NILE - INNOVATOR®

↑ PEEL HERE  
DESPECUE AQUÍ



## WEST NILE - INNOVATOR®

**Instrucciones:** Agitar bien. Asepticamente administrar 1 mL por vía intramuscular. Los caballos sanos deben recibir dos dosis administradas con 3-6 semanas de diferencia. Para obtener consejos sobre la frecuencia de revacunación o ante el estrés o la exposición, consulte a su veterinario o al fabricante.

**Precauciones:** Almacenar entre 2° y 8°C. La exposición prolongada a temperaturas más elevadas y/o a la luz directa del sol puede afectar adversamente la potencia. Evitar la congelación. Utilizar todo el contenido una vez abierto. En algunas ocasiones, pueden presentarse reacciones locales transitorias en el sitio de inyección. No vacunar dentro de los 21 días anteriores al sacrificio. Contiene formalina, timerosal, neomicina y polimixina B como agentes conservantes. No mezclar con otros productos. Consulte al Médico en caso de exposición al producto.

Las preguntas técnicas se deben dirigir a Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.

## WEST NILE - INNOVATOR®

**Directions:** Shake well. Aseptically administer 1 mL intramuscularly. Healthy horses should receive two doses administered 3-6 weeks apart. For advice on revaccination frequency or in the face of stress or exposure, contact your veterinarian or the manufacturer.

**Precautions:** Store at 2°-8°C. Prolonged exposure to higher temperatures and/or direct sunlight may adversely affect potency. Do not freeze. Use entire contents when first opened. Transient local reactions may occur at the injection site. Do not vaccinate within 21 days before slaughter. Contains formalin, thimerosal, neomycin, and polymyxin B as preservatives. Do not mix with other products. In case of human exposure, contact a physician.

Technical inquiries should be directed to Zoetis Inc. Veterinary Services, (888) 963-8471.