HOW TO USE ORBESEAL®

When managing dry cows, correct procedures must be followed to help prevent mastitis infections. At all times, dry cow materials must be kept away or shielded from possible fecal/urine contamination. We recommend disposable gloves be worn during the disinfection process. Orbeseal® should be stored at room temperature (60-85°F) If Orbeseal becomes difficult to administer in extremely cold weather, it should be warmed to room temperature. Individual tubes should not be immersed in water. The bucket for Orbeseal can be lowered into a 5 gallon bucket filled with warm water to warm the tubes.

AFTER USING YOUR CURRENT DRY COW TREATMENT PROGRAM, PERFORM THE FOLLOWING STEPS:



1

Teats should be clean and dry. If teats are not clean, CAREFULLY clean and dry them prior to disinfection.



2

Using an alcohol pad, physically clean the end of the teat to remove any contaminated skin, dirt or manure. Repeat until the pad remains clean.



3

Disinfect the far teats before the near teats to avoid accidental contamination of previously disinfected teats.



4

Insert the syringe nozzle of Orbeseal into the teat canal, grasp the base of the teat near the udder attachment with two fingers pressed firmly together and slowly inject all contents. Use one complete syringe per quarter. Do not massage. Orbeseal must remain in the teat canal to be effective.



5

Insert Orbeseal in the nearest teats first to minimize contamination of teats that have not been treated.



6

After inserting Orbeseal, mark the cow so others can tell she's been dried off. Then dip each teat with a quality teat dip.

TO REMOVE ORBESEAL, PERFORM THE FOLLOWING STEPS:



1

To effectively strip Orbeseal, be sure to grab the top of the teat – where it meets the udder – and work all the way down. Don't grab the middle of the teat, squeeze and work down. This will only clear the bottom half of the teat. Strip the entire quarter by starting at the top and working all the way down.



2

Strip aggressively – 10 to 12 times per milking – for the first 3 to 4 days post-freshening. This helps to ensure that you're removing the plug and all particles of Orbeseal. **Do not remove Orbeseal by action of the milking machine.**

Refer to the Orbeseal label for complete instructions on proper administration at dry off and removal at freshening.

All trademarks are the property of Zoetis Services LLC or a related company or a licensor unless otherwise noted.
© 2023 Zoetis Services LLC. All rights reserved. ORB-00056R2

zoetis

COMO USAR ORBESEAL®

Cuando se trata de las vacas secas, se deben seguir los procedimientos correctos para facilitar la prevención de la mastitis infecciosa. En todo momento, los materiales para las vacas secas deben mantenerse alejados o protegidos de la posible contaminación fecal-urinaria. Recomendamos usar guantes desechables durante el proceso de desinfección. Orbeseal® se debe conservar a la temperatura ambiente (60-85°F). Si Orbeseal se vuelve difícil de administrar en condiciones de clima extremadamente frío, se debe calentar a la temperatura ambiente. Los tubos individuales no se deben sumergir en agua. El cubo de Orbeseal se puede colocar en un cubo con 5 galones de agua caliente para calentar los tubos.

REALICE LOS PASOS SIGUIENTES DESPUÉS DE USAR SU PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE VACA SECA ACTUAL:



1

Las pezones deben estar limpios y secos. Si los pezones no están limpios, límpielos y séquelos cuidadosamente antes de la desinfección.



2

Con una almohadilla humedecida en alcohol, limpie físicamente el extremo del pezón para eliminar la piel contaminada, suciedad o estiércol. Repita hasta que la almohadilla salga limpia.



3

Desinfecte los pezones más distantes antes de los cercanos para evitar la contaminación accidental de los pezones desinfectados previamente.



4

Inserte la cánula de la jeringa de Orbeseal en el conducto del pezón, sujete la base del pezón cerca a de la unión con la ubre usando dos dedos para presionar firmemente e inyecte con lentitud todo el contenido. Use una jeringa completa para cada cuarto. No masajee. Orbeseal debe permanecer en el conducto del pezón para que sea eficaz.



5

Inserte Orbeseal en los pezones más cercanos primero, para minimizar la contaminación de los pezones que no se han tratado.



6

Después de insertar Orbeseal, marque la vaca para que otras personas sepan que es una vaca seca. Luego, sumerja cada pezón en un desinfectante de pezones de calidad.

REALICE LOS PASOS SIGUIENTES PARA RETIRAR ORBESEAL:



1

A fin de retirar eficazmente Orbeseal, asegúrese de sujetar el extremo superior del pezón, donde se une con la ubre, y luego aplique un movimiento hacia abajo. No sujete la parte media del pezón para comprimirlo y usar un movimiento hacia abajo. Esto solo retirará el producto de la mitad inferior del pezón. Empiece en el extremo superior y use un movimiento hacia abajo para limpiar todo el cuarto.



2

Despunte intensamente, 10 a 12 veces por ordeño, durante los primeros 3-4 días después del parto. Esto ayuda a garantizar que retira el tapón y todas las partículas de Orbeseal. **No retire Orbeseal con la acción de la máquina de ordeño.**

Consulte instrucciones completas sobre la administración adecuada en el período seco y la extracción al momento de la revitalización en la etiqueta de Orbeseal.

Todas las marcas registradas son propiedad de Zoetis Services LLC o una compañía relacionada o un licenciatario, salvo indicación en contrario. © 2023 Zoetis Services LLC. Todos los derechos reservados.ORB-00056R2

zoetis