

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### CLAMOXYL LA

#### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παραγωγός:

Haupt Pharma Latina Srl

SS 156 Km 47,600

04100 Borgo San Michele ( Latina )

Italy

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας : Zoetis Hellas SA, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51, Ν.

Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6791900, ΑΜΚ: 16951/4-3-09

#### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

CLAMOXYL LA

#### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ( Α ) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ( Α ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά ml:

Amoxicillin Trihydrate	176mg
Αντιστοιχεί σε Amoxycillin	150mg

Έκδοχα:

Aluminum Stearate	16 mg
Fractionated coconut oil έως	1ml
Phenol BP	
Coconut oil Base	

#### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ )

Για τον έλεγχο πρωτογενών και δευτερογενών λομώξεων , που προκαλούνται Από ευαίσθητους στην αμοξικιλίνη μικροοργανισμούς στα βοοειδή, πρόβατα χοίρους, σκύλους και γάτες, όπου είναι επιθυμητή η παρατεταμένη δραστηκότητα με μία μόνο ένεση.

Το ClamoxyL LA συνιστάται κυρίως για:

- Λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της εντερίτιδας.
- Λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος,
- Λοιμώξεις του ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος,
- Λοιμώξεις του δέρματος και των μαλακών ιστών,
- Πρόληψη των μετεγχειρητικών λοιμώξεων.
- Ως συμπλήρωμα στην ενδομαστική θεραπεία της μαστίτιδας των βοοειδών.

#### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η αμοξικιλίνη, όπως και οι άλλες πενικιλίνες, δεν πρέπει να χορηγείται από το στόμα ή παρεντερικά στα κουνέλια και στα τρωκτικά όπως ινδικά χοιρίδια, κρικητοί γερβίλοι κ.ά. Επίσης δεν πρέπει να χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας.

#### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μερικές φορές μπορεί να παρατηρηθεί τοπική αντίδραση των ιστών στην περιοχή της ένεσης. Επίσης μπορεί να παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας. *Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον κτηνίατρο σας.*

## **7.ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ**

Βοοειδή, πρόβατα, χοίροι, σκύλοι, γάτες.

## **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 15mg/kg σωμ. βάρους(αντιστοιχεί σε 1ml/10kg σωμ. βάρους.). Εάν κριθεί απαραίτητο η ίδια δοσολογία μπορεί να επαναληφθεί μετά 48 ώρες. Το προϊόν χορηγείται μόνο ενδομυικά στα παραγωγικά ζώα και υποδόρια ή ενδομυικά στο σκύλο ή και στη γάτα.

Να ανακινείται καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση για να επιτευχθεί καλύτερη ομοιογένεια της δραστικής ουσίας. Μετά την ένεση να γίνεται μάλαξη της περιοχής της ένεσης.(για την ευκολότερη χορήγηση στους σκύλους και γάτες να μη χρησιμοποιείτε βελόνες μεγαλύτερη από το No 20G).

Να μην ενίεται ποσότητα μεγαλύτερη από 10ml, σε κάθε σημείο χορήγησης.

Όπως συμβαίνει και με τα άλλα σκευάσματα πενικιλίνης, με την παρουσία νερού γίνεται ταχύτατα υδρόλυση. Επομένως είναι σημαντικό η σύριγγα με την οποία θα αναρροφηθεί η απαιτούμενη ποσότητα από το φιαλίδιο, να είναι στεγνή ώστε να μην έλθει σε επαφή η παραμένουσα στο φιαλίδιο ποσότητα με σταγόνες νερού.

Για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αριθμός διατρήσεων του ελαστικού πώματος, συνιστάται όπως το φιαλίδιο των 250ml χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία των μεγάλων ζώων.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Να ανακινείται καλά το φιαλίδιο πριν τη χρήση για να επιτευχθεί καλύτερη ομοιογένεια της δραστικής ουσίας. Μετά την ένεση να γίνεται μάλαξη της περιοχής της ένεσης.(για την ευκολότερη χορήγηση στους σκύλους και γάτες να μη χρησιμοποιείτε βελόνες μεγαλύτερη από το No 20G).

Να μην ενίεται ποσότητα μεγαλύτερη από 10ml, σε κάθε σημείο χορήγησης.

Όπως συμβαίνει και με τα άλλα σκευάσματα πενικιλίνης, με την παρουσία νερού γίνεται ταχύτατα υδρόλυση. Επομένως είναι σημαντικό η σύριγγα με την οποία θα αναρροφηθεί η απαιτούμενη ποσότητα από το φιαλίδιο, να είναι στεγνή ώστε να μην έλθει σε επαφή η παραμένουσα στο φιαλίδιο ποσότητα με σταγόνες νερού.

Για να αποφευχθεί ο υπερβολικός αριθμός διατρήσεων του ελαστικού πώματος, συνιστάται όπως το φιαλίδιο των 250ml χρησιμοποιείται μόνο για τη θεραπεία των μεγάλων ζώων.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Βοοειδή: Κρέας 92 ημέρες

Γάλα 216 ώρες( 9 ημέρες)

Αιγοπρόβατα: Κρέας 45 ημέρες

Γάλα 156 ώρες( 6,5 ημέρες)

Χοίροι: Κρέας 93 ημέρες

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Διατηρείται το φάρμακο σε θερμοκρασία μικρότερη από 25C.Ο χρόνος ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα είναι 1 μήνας.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

## **13.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Η απόρριψη προϊόντος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ή των αχρήστων υλικών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.**

**Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.**

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777