

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

LINCOMIX® 44

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:

Zoetis HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό 154 51, Αθήνα
Τηλ.: (210)6791900, ΑΜΚ: 12942/ 5-4-1995

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

PFIZER SERVICE COMPANY ZAVENTEM, BELGIUM

Ή

Zoetis Belgium SA

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

LINCOMIX® 44

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

1 Kg περιέχει:

Δραστικά:

Λινκομυκίνη βάση (ως λινκομυκίνη υδροχλωρική) 44g

Έκδοχα:

Υγρή παραφίνη 10 g

Άλεуро σόγιας qs 1Kg

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της δυσεντερίας των χοίρων, που οφείλεται στη *Serpulina hyodysenteriae*.

Για τη θεραπεία και τον έλεγχο της ενζωτικής πνευμονίας των χοίρων.

Για την πρόληψη και τη θεραπεία της υπερπλαστικής εντεροπάθειας (*Lawsonia intracellularis*) των χοίρων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται το LINCOMIX 44 σε ζώα, με ιστορικό υπερευαισθησίας στις λινκοσαμίδες.

Η χρήση του σε άλλα είδη ζώων μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικές διαταραχές.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μαλακά κόπρανα και / ή ήπιο οίδημα και ερεθισμός του πρωκτού και / ή του αιδοίου σπάνια παρατηρήθηκε σε χοίρους, τις πρώτες δύο ημέρες, από την έναρξη της θεραπείας. Αυτό είναι συνήθως παροδικό. Σε σπάνιες περιπτώσεις, σε ορισμένους χοίρους μπορεί να εμφανισθεί ερύθημα του δέρματος και ερεθισμός του. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως υποχωρούν σε 5 έως 8 ημέρες, χωρίς να απαιτείται η διακοπή της θεραπείας.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Έλεγχος της δυσεντερίας των χοίρων: 44g λινκομυκίνης ανά 1000 kg τροφής (που αντιστοιχεί σε 1 kg LINCOMUX 44 ανά 1000 kg τροφής) για 5 έως 7 εβδομάδες.

Θεραπεία της δυσεντερίας των χοίρων: 110 g λινκομυκίνης ανά 1000 kg τροφής (που αντιστοιχεί σε 2,5 kg LINCOMUX 44 ανά 1000 kg τροφής) για 3 εβδομάδες ή έως ότου αποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Έλεγχος της ενζωτικής πνευμονίας: 110 g λινκομυκίνης ανά 1000 kg τροφής (που αντιστοιχεί σε 2,5 kg LINCOMUX 44 ανά 1000 kg τροφής) για 3 έως 5 εβδομάδες.

Θεραπεία της ενζωτικής πνευμονίας: 220 g λινκομυκίνης ανά 1000 kg τροφής (που αντιστοιχεί σε 5 kg LINCOMUX 44 ανά 1000 kg τροφής).

Πρόληψη και θεραπεία της υπερπλαστικής εντεροπάθειας των χοίρων: 44 – 110 g λινκομυκίνης ανά 1000 kg τροφής (που αντιστοιχεί σε 1 – 2,5 kg LINCOMUX 44 ανά 1000 kg τροφής) για 3 εβδομάδες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Χοίροι : 1 ημέρα

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Μη φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C

Να φυλάγεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ανοικτοί περιέκτες να φυλάγονται σε χώρο ξηρό για να αποφεύγεται το σβόλιασμα.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Να τηρούνται οι συνθήκες καλής παρασκευής κατά την προετοιμασία της τροφής, που περιέχει LINCOMUX 44. Αυτό συμπεριλαμβάνει την ομογενή ανάμειξη στην τροφή και την απαραίτητη καθαριότητα, ώστε να αποφευχθεί η μόλυνση του προμίγματος.

Στα εργοστάσια ζωοτροφών που παράγουν ζωοτροφές και για μηρυκαστικά, τα μηχανήματα πρέπει να καθαρίζονται πολύ καλά, διότι τα κατάλοιπα της λινκομυκίνης δυνατόν να προκαλέσουν καταστροφή της μικροβιακής χλωρίδας, που προκαλεί οξοναιμία.

Προσοχή, ώστε να μην εισπνέετε τη σκόνη. Να αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Συνιστάται η χρησιμοποίηση μάσκας προσώπου κατά την ανάμειξη και χορήγηση του προϊόντος. Να πλένονται τα χέρια και το δέρμα, που ήρθε σε επαφή με το προϊόν.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

Τηλ. Κέντρου Δηλ. : 210 7793777