

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

NEO-TERRAMYCIN SOLUBLE POWDER

### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Pfizer Inc, NY, USA

Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, Αυλώνα , Αττικής

Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas ΑΕ, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

NEO TERRAMYCIN SOLUBLE POWDER

### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε 1kg του προϊόντος περιέχει:

#### ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΗCL(BASED ON A POTENCY OF 905 MG/G OΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΤΗΤΑ) 60,8gr

ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ ΣΥΛΦΑΤΗ(BASED ON A POTENCY OF 526MG/GR ΝΕΟΜΥΚΙΝΗ ΒΑΣΗ ΑΚΤΙΒΙΤΗΤΑ) 73,2gr

#### ΕΚΔΟΧΑ

TARTARIC ACID 100gr

FD&C YELLOW 6 2,0gr

SUCROSE 764gr

### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ )

Το Neo Terramycin soluble powder ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία νοσημάτων του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος των μόσχων, χοίρων, ορνίθων και ινδιάνων

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ** Να μην χορηγείται το φάρμακο σε όρνιθες κατά την περίοδο της ωοπαραγωγής, τα αυγά των οποίων προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Οι τετρακυκλίνες κατά την περίοδο ανάπτυξης των οδόντων περιλαμβανομένου και του τελευταίου σταδίου της εγκυμοσύνης προκαλεί δυσχρωματισμό τους.

### 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, χοίροι, όρνιθες, ινδιάνοι.

### 7. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ( ΟΙ ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

#### α. Φάκελλος 100gr.

##### Μόσχοι

Βακτηριακή εντερίτιδα,

##### Πρόληψη

1 φάκελλος ανά 220

##### Θεραπεία

2 φάκελλοι ανά

ομφαλοφλεβίτιδα, λίτρα νερό. 220 λίτρα νερό.  
σηψαιμία των νεογνών.

Χοίροι

Βακτηριακή εντερίτιδα, 1 φάκελλος ανά 220 2 φάκελλοι ανά  
νεκρωτική εντερίτιδα, λίτρα νερό. 220 λίτρα νερό  
δυσεντερία, σαλμονελλώσεις.

Όρνιθες/Ινδιάνοι

-Λειροκυάνωση(blue comb), 1 φάκελλος(5.5g οξυτετρα- 2 φάκ(11g οξυτε  
εντερίτιδα, εξαμιτίαση, κυκλίνη βάση και 3.85g τρακυκλίνη βάση  
πρώρη θνησιμότητα νεοσσών νεομυκίνη βάση) ανά &7.7g νεομυκίνη  
110 λίτρα νερό. βάση) ανά 110  
λίτρα νερό

-Χρόνια αναπνευστική νόσος 1 φάκελλος ανά 110 λίτρα 2 φάκελλοι ανά  
(ΧΑΝ), λοιμώδης κολπίτιδα νερό. 110 λίτρα νερό.  
ινδιάνων, κόρυζα, χολέρα  
πουλερικών.

-Βακτηριακή εντερίτιδα, 1 φάκελλος ανά 110 λίτρα 2 φάκελλοι ανά  
καταπόνηση, stress λόγω νερό. 110 λίτρα νερό.  
εμβολιασμών και απότομων  
καιρικών μεταβολών.

**β. φάκελλος 500 γρ.**

Μόσχιοι

Βακτηριακή εντερίτιδα,  
ομφαλοφλεβίτιδα,  
σηψαιμία των νεογνών.

Πρόληψη

1 φάκελλος ανά 1100  
λίτρα νερό.

Θεραπεία

2 φάκελλοι ανά  
1100 λίτρα νερό.

Χοίροι

Βακτηριακή εντερίτιδα, 1 φάκελλος ανά 1100 2 φάκελλοι ανά  
νεκρωτική εντερίτιδα, λίτρα νερό. 1100 λίτρα νερό  
δυσεντερία, σαλμονελλώσεις.

Όρνιθες/ Ινδιάνοι

-Λειροκυάνωση(blue comb), 1 φάκ(27.5g οξυτετρα- 2 φάκ(55g οξυτε-  
εντερίτιδα, εξαμιτίαση, κυκλίνη βάση & 19.25g τρακυκλίνη βάση  
πρώρη θνησιμότητα νεοσσών νεομυκίνη βάση) ανά &38.5g νεομυκίνη  
550 λίτρα νερό. βάση) ανά 550  
λίτρα νερό.

-Χρόνια αναπνευστική νόσος 1 φάκελλος ανά 550 λίτρα 2 φάκελλοι ανά

(ΧΑΝ), λοιμώδης κολπίτιδα ινδιάνων, κόρυζα, χολέρα πουλερικών.	νερό.	550 λίτρα νερό.
-Βακτηριακή εντερίτιδα, καταπόνηση, stress λόγω εμβολιασμών και απότομων καιρικών μεταβολών	1 φάκελλος ανά 550 λίτρα νερό.	2 φάκελλοι ανά 550 λίτρα νερό.

### 9. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Τα ζώα να μην σφάζονται και το κρέας τους να μη διατίθεται στην κατανάλωση πριν περάσουν τα πιο κάτω χρονικά διαστήματα από την τελευταία χορήγηση του φαρμάκου.

Μόσχοι:	7 ημέρες
Χοίροι :	5 ημέρες
Ορνίθια κρεατοπαραγωγής:	5 ημέρες
Ορνιθες ωοπαραγωγής:	14 ημέρες
Ινδιάνοι:	14 ημέρες

### 10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε χώρο ξηρό και δροσερό.

### 11.ΕΙΔΙΚΗ ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΕΙΣ )

Δεν εφαρμόζεται.

### 12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Δεν εφαρμόζεται.

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Τηλ. Κέντρου Δηλ:210 7793777

ΆΜΚ : 14400/14-5-92