

(別記)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	オキシトライカ ンを含む 農薬の総 使用回数	スロブトマイシ ンを含む 農薬の総 使用回数									
りんご	枝枯細菌病	2000倍	200~700 ℓ/10a	収穫60日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内									
なし				収穫75日前 まで													
もも	せん孔細菌病	1500倍		収穫60日前 まで	2回以内		5回以内	2回以内									
うめ	かいよう病	1000倍		収穫90日前 まで			4回以内										
ずもも	黒斑病	1500倍		収穫30日前 まで			3回以内		4回以内 (樹幹注入は 1回以内)								
キウフルーツ	花腐細菌病	1000倍		100~300 ℓ/10a	落花期 まで		3回以内	5回以内 (種いもへ の処理は 1回以内)	5回以内 (種いもへ の処理は 1回以内)								
	かいよう病																
ばれいしょ	疫病	40~100倍		—	—		1回	5~10秒間 種いも浸漬 種いも散布	5回以内 (種いもへ の処理は 1回以内)								
	軟腐病									1000~ 1600倍							
	黒あし病 そうか病									—							
キャベツ	黒腐病	2000倍	100~300 ℓ/10a	—	—	—	—										
はくさい	軟腐病	1500~ 3000倍						収穫14日前 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内					
		2000倍						—	3回以内		4回以内	3回以内					
レタス	腐敗病	2000倍						100~300 ℓ/10a	—		—	—	—				
たまねぎ	軟腐病	1000倍												収穫7日前 まで	2回以内	2回以内	2回以内
にんにく	春腐病													5回以内	5回以内	5回以内	
こんにゃく	葉枯病		250~ 500倍	—	—	—	—							—			
	腐敗病							—	3回以内	3回以内	3回以内						
ほおずき	斑点細菌病	1000倍	100~300 ℓ/10a	発病初期	3回以内	散布	3回以内	4回以内									
シラネ	葉腐細菌病	1000倍	200~300 mℓ/鉢	葉組み時	8回以内 (但し土壌 灌注は 4回以内)		土壌灌注	8回以内	8回以内								
				鉢上げ時 又は 鉢替え時													
たばこ	野火病 角斑病	1500倍	100~180 ℓ/10a	—	—	—	—	—									
	吊り腐れ (空胴病菌 による) 空胴病	1000~ 1500倍							1000~180 ℓ/10a	収穫3日前 まで	2回以内	2回以内					
													疫病	1000倍			
桑	縮葉細菌病	500倍	200~700 ℓ/10a	—	3回以内	3回以内											
西洋芝 (ペントグ ラス) (生産圃場)	かさ枯病	500倍	0.5 ℓ/m ²	発病前~ 発病初期	8回以内	8回以内											