

## ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ PRIMUCELL FIP

### 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ ( Α ) ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ( Α )

Κάθε δόση του εμβολίου περιέχει :

#### ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Ζωντανό εξασθενημένο ιό της λοιμώδους περιτονίτιδας,

της γάτας, στέλεχος DF2-ts το ελάχιστο:

10<sup>4.8</sup> CCID<sub>50</sub>

#### ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ(διαλύτης)

Απεσταγμένο νερό.

0,5 ml (1 δόση)

### 3. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Παρασκευαστής: Zoetis Belgium SA,Belgium

Συσκευαστής : Zoetis Belgium SA,Belgium

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας : Zoetis Hellas SA, Λ. Μεσογείων 253-255, 154 51,  
Ν. Ψυχικό, Αθήνα, Τηλ: 210 6791900, ΑΜΚ: 64231

### 4. ΕΙΔΟΣ ( Η ) ΖΩΟΥ ( ΩΝ )

Γάτες

### 5.ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Πρόληψη της λοιμώδους περιτονίτιδας της γάτας.

### 6.ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ

Σε κάθε ρουθούνι χορηγείται η μισή δόση (0.25 ml).

### 7. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ (ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

#### Εμβολιακό πρόγραμμα.

Το Primucell FIP, χορηγείται σε γάτες ηλικίας μεγαλύτερης των 16 εβδομάδων, με δύο δόσεις σε διάστημα 3 εβδομάδων. Απαιτείται ετήσιος αναμνηστικός εμβολιασμός

### 8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το Primucell FIP, χορηγείται στις γάτες με ενδορρινική ενστάλαξη, αφού πρώτα το λυόφιλο τμήμα ανασυσταθεί με όλο τον αποστειρωμένο διαλύτη (0.5 ml), χρησιμοποιώντας το σταγονόμετρο που υπάρχει μέσα στην συσκευασία. Στην συνέχεια, σε κάθε ρουθούνι χορηγείται η μισή δόση (0.25 ml).

### 9.ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ασθενή ζώα δεν πρέπει να εμβολιάζονται.

### 10. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναμένονται, αλλά εάν εμφανισθούν, δεν απαιτείται ειδική θεραπεία εκτός από την συμπτωματική.

### 11.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

## **12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσετε σε ψυγείο ( +2 C – 8C ).

Να μην καταψύχεται.

Διάρκεια ζωής : 2 χρόνια.

## **13. ΕΙΔΙΚΗ ( ΕΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ( ΕΙΣ )**

Εάν συμβεί αναφυλακτική αντίδραση χορηγήστε αδρεναλίνη ή αντίστοιχο φάρμακο.

Δεν απαιτείται ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τον εμβολιασμό. Ο εμβολιακός εξοπλισμός να είναι καθαρός και αποστειρωμένος πριν και κατά τη χρήση του.

## **14 ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Τα άδεια ή τα μερικώς χρησιμοποιηθέντα φιαλίδια του εμβολίου,θα πρέπει να καταστρέφονται σε κλίβανο, αλλιώς να απολυμαίνονται πριν την απόρριψή τους. Το Primucell FIP μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τα εμβόλια της λοιμώδους πανλευκοπενίας, της ρινοτραχειίτιδας, του καλυκοιού και της χλαμυδίασης.

## **15. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΩΚΛΕΙΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

## **16.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το εμβόλιο πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύστασή του.

Να φυλάσσετε σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Το προϊόν χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

Τηλ. Κέντρου Δηλ. : 210 7793777

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος.