

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TERRAMYCIN AEROSOL SPRAY

### **1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Δικαιούχος σήματος : Pfizer Inc, NY, USA

Παραγωγός υπεύθυνος και για την απελευθέρωση της παρτίδας:

Heinrich-Mach. Nachf. Heinrich-Mack- strasse 35, D-89257 Illertissen, Germany

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer Hellas AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν.

Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

### **2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

TERRAMYCIN AEROSOL SPRAY

### **3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε 1ml του προϊόντος περιέχει:

ΟΧΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΗCL

10,28 gr

### **4. ΕΝΔΕΙΞΗ ( ΕΙΣ )**

Το Terramycin aerosol spray ενδείκνυται για τον έλεγχο και την θεραπεία των

τοπικών δερματικών λοιμώξεων που προκαλούνται ή σχετίζονται με

μικροοργανισμούς ευαίσθητους στην δράση της οξυτετρακυκλίνης.

Ειδικές ενδείξεις : λοιμώδης ποδοδερματίτιδα των προβάτων, δακτυλική δερματίτιδα των βοοειδών.

### **5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Δεν αναφέρονται.

### **6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν αναφέρονται.

### **7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Βοοειδή, πρόβατα, αίγες, σκύλος, γάτα .

### **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται μόνο τοπικά.

### **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Το άτομο που το χορηγεί πρέπει να φοράει λαστιχένια γάντια.

Να πλένονται τα χέρια του χρήστη μετά την χρήση.

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά.

Μη χορηγείται το προϊόν πλησίον των οφθαλμών.

Μην ψεκάζεται κοντά σε γυμνή φλόγα ή σε πηγές ανάφλεξης.

Μην καπνίζεται όταν χειρίζεστε το προϊόν.

Η χορήγηση του φαρμάκου γίνεται μόνο τοπικώς. Πριν από τον ψεκασμό η

προσβεβλημένη περιοχή να καθαρίζεται καλά. Αναταράξτε καλά τον περιέκτη πριν

από την χρήση και ψεκάστε για 1-2 δευτερόλεπτα. Για την ποδοδερματίτιδα των

προβάτων ψεκάστε για 3-5 δευτερόλεπτα. Το βιολετί χρώμα σας υπενθυμίζει που

έγινε η χορήγηση. Σε βαθειά διείσδυση της μόλυνσης και σε σοβαρά και χρόνια περιστατικά η τοπική χρήση της Terramycin aerosol spray πρέπει να συνοδεύεται από παρεντερική χορήγηση Terramycin.

**10.ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας: 0 ημέρες

Γάλα : 0 ημέρες

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να διατηρείται σε δροσερό χώρο. Ο περιέκτης βρίσκεται υπό πίεση, γι' αυτό να μην εκτίθεται στη ζέστη ή τον ήλιο και να μη θραύεται ή παραβιάζεται.

**12. ΕΙΔΙΚΗ ( ΕΙΣ ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμία.

**11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Καμία.

Να χορηγείται με κτηνιατρική συνταγή

Να φυλάγεται μακριά από τα παιδιά

Τηλ. Κέντρου Δηλ.: 210 7793777

ΑΜΚ : 24598/93/11-5-1994